

OLIMPIADA DE CHIMIE
etapa județeană/municipiului București
4 februarie 2023
Clasa a IX-a
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Orice metodă de rezolvare corectă a cerințelor va fi punctată corespunzător.

Subiectul I (25 de puncte)

A. 10 puncte

- a) Identificarea elementului: perioada a 6-a, $5d^{10}$, comportament similar metalelor alcaline => elementul este TI (Taliu) => $A=204,4$

$${}_{81}^{A_1}Tl \%a \quad {}_{81}^{A_2}Tl \%b \Rightarrow A_1 + 2 = A_2; \quad a + b = 100; \quad \frac{b}{a} = 2,387 \Rightarrow a = 29,524\% \quad b = 70,476\%$$

$$0,29524A_1 + 0,70476A_2 = 204,4$$

$$A_1 = 203, \quad A_2 = 205 \dots\dots\dots 2 \times 2 \text{ p} = \mathbf{4 \text{ puncte}}$$

$${}_{81}^{203}Tl \quad {}_{81}^{205}Tl \dots\dots\dots 2 \times 1 \text{ p} = \mathbf{2 \text{ puncte}}$$

- b) ${}_{81}^{203}Tl$ 81 protoni, 122 neutroni ${}_{81}^{205}Tl$ 81 protoni, 124 neutroni..... $4 \times 0,5 \text{ p} = \mathbf{2 \text{ puncte}}$

- c) $TI \rightarrow TI^+$; $[Xe] 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^1 \rightarrow [Xe] 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^0 + 1e^-$; cedează electron din substrat exterior (energie de ionizare mai mică) => stare de oxidare mai stabilă;..... $\mathbf{1 \text{ punct}}$

- $TI \rightarrow TI^{3+}$; $[Xe] 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^1 \rightarrow [Xe] 4f^{14} 5d^{10} 6s^0 6p^0 + 3e^-$; cedează electroni din substrat exterior și din substrat ecranat/interior (energie de ionizare mai mare) => stare de oxidare mai puțin stabilă;..... $\mathbf{1 \text{ punct}}$

B. 10 puncte

a)

Locul în celula elementară	Număr de ioni	
	Mg^{2+}	O^{2-}
Centru cub (1)	1	0
Fete cub (6)	0	$6 \cdot 1/2 = 3$
Muchii cub (12)	$12 \cdot 1/4 = 3$	0
Vârfuri (8)	0	$8 \cdot 1/8 = 1$
Total	4	4

4 ioni Mg^{2+} și 4 ioni O^{2-} $2 \times 2 \text{ p} = \mathbf{4 \text{ puncte}}$

a) $r_{Na^+} > r_{Mg^{2+}} \Rightarrow \frac{r_{Na^+}}{r_{Mg^{2+}}} = 1,4166 \Rightarrow r_{Mg^{2+}} = 72 \text{ pm}$; $r_{Cl^-} > r_{O^{2-}} \Rightarrow \frac{r_{O^{2-}}}{r_{Cl^-}} = 0,7735$

$$\frac{r_{Mg^{2+}}}{r_{O^{2-}}} = 0,5143 \Rightarrow r_{O^{2-}} = 140 \text{ pm} \dots\dots\dots \mathbf{2 \text{ puncte}}$$

$$l - \text{lungimea muchiei, } l = 2(r_{Mg^{2+}}) + 2(r_{O^{2-}}) = 424 \text{ pm};$$

$$l^3 = V_{\text{celulă}} \Rightarrow V_{\text{celulă}} = 76,225024 \cdot 10^{-30} \text{ m}^3 \dots\dots\dots \mathbf{2 \text{ puncte}}$$

$$1 \text{ kmol MgO} \xrightarrow{40 \text{ kg MgO}} 6,022 \cdot 10^{26} \text{ perechi } Mg^{2+} O^{2-}$$

$$\xrightarrow{40/6,022 \cdot 10^{26}} 1 \text{ pereche } Mg^{2+} O^{2-}$$

$$m_{\text{celulă}} = 4 \cdot 40/6,022 \cdot 10^{26} \text{ kg} \Rightarrow \dots\dots\dots \mathbf{1 \text{ punct}}$$

$$\rho = m/V \Rightarrow \rho = 3,48 \text{ t/m}^3 \text{ sau (kg/dm}^3) \text{ sau (g/cm}^3) \dots\dots\dots \mathbf{1 \text{ punct}}$$

C. 5 puncte

Numerele de oxidare ale elementelor: (a) +3; (b) +1; (c) +8; (d) +2; (e) +3 $5 \times 1 \text{ p} = \mathbf{5 \text{ puncte}}$











Subiectul al II-lea (25 de puncte)

A. 15 puncte




- a) determinarea substanțelor: **c** = $FeCl_3$, **e** = $FeCl_2$, **i** = HNO_3 , **m** = KCN $4 \times 1 \text{ p} = \mathbf{4 \text{ puncte}}$

Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

b).....11 ecuații x 1 punct (0,5p formule; 0,5p coeficienți) = **11 puncte**



B. 10 puncte



$Fe_2O_3 + 3H_2 \rightarrow 2Fe + 3H_2O$ 4 x 0,5p (0,25p formule; 0,25p coeficienți) = **2 puncte**

$n_{Fe} = \frac{3,92}{56} = 0,07 \text{ mol Fe}; n_{ap\acute{a}} = 0,05 \text{ mol}$

notăm: a mol Fe, b mol FeO, c mol Fe₂O₃

rezultă sistemul:

$a + b + 2c = 0,07$

$b + 3c = 0,05$

$a = b + c$

rezultă a = 0,03; b = 0,02; c = 0,01;3 x 0,5p = **1,5 puncte**



Conform ecuațiilor reacțiilor: $n_{hidrogen \text{ consumat}} = b + 3c = 0,02 + 0,03 = 0,05 \text{ mol}$

Randament 50% $\rightarrow 0,05 \cdot \frac{100}{50} = 0,1 \text{ mol hidrogen teoretic la hidroliz\acute{a}}$

Notăm cu x moli NaH și y moli KH; $\frac{2,884}{100} = \frac{x+y}{24x+40y}$; $2x = y$; conform ecuațiilor reacțiilor avem 3x moli de

hidrogen; $3x = 0,1$; $x = \frac{0,1}{3}$;

$m_{hidruri} = \frac{0,1}{3} \cdot 24 + \frac{0,2}{3} \cdot 40 = 0,8 + 2,66 = 3,46 \text{ g}$ **4 puncte**



$Fe_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2FeCl_3 + 3H_2O$ 3 x 0,5p (0,25p formule; 0,25p coeficienți) = **1,5 puncte**

total moli HCl 0,06 + 0,04 + 0,06 = 0,16 mol $\Rightarrow V_S = 1,6 \text{ L soluție HCl}$ **1 punct**

Subiectul al III-lea (30 de puncte)

A.13 puncte

a)

Substanța (X) este un salpetru \Rightarrow anionul azotat (nitrat)..... **1 punct**

Cationul se identifică cu soluția de KOH \Rightarrow NH₃ gaz înțepător, caracter bazic

\Rightarrow cation amoniu **1 punct**

Substanța (X) = NH₄NO₃..... **1 punct**

Substanța (Y) = C (carbon) **2 puncte**

b) Vas B – soluție de acid sulfuric **1 punct**

Vas D – soluție de hidroxid de potasiu..... **1 punct**

Dacă în vasul B ar fi soluție de hidroxid de potasiu, soluția rece va condensa vaporii de apă, respectiv va absorbi dioxidul de carbon **1 punct**

Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

- c) Vas B – în soluția de acid sulfuric are loc absorbția vaporilor de apă, fierbinți, soluția se diluează, $c < 49\%$ **1 punct**
 Vas D – în soluția de KOH are loc absorbția CO_2 cu formare de KHCO_3 și K_2CO_3 **1 punct**
 $\text{KOH} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{KHCO}_3$
 $2\text{KOH} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{K}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ 2 x 1p (0,5p formule; 0,5p coeficienți) = **2 puncte**
- d) Prin încălzirea amestecului (A) se formează H_2O , CO_2 și N_2
 $2\text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{C} \rightarrow 4\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + 2\text{N}_2$ **1 punct**

B **17 puncte**

a) $\text{AB}_5\text{DE}_3 \rightarrow \text{AB}_3 + \text{DE}_2 + \text{B}_2\text{E}$ **1,5 puncte**

$2\text{AB}_5\text{DE}_3 + \text{CaCl}_2 \rightarrow 2\text{AB}_4\text{Cl} + \text{Y}$ **1,5 puncte**



Identificarea corectă prin calcul: $\text{A} = \text{N}$, $\text{B} = \text{H}$, $\text{D} = \text{C}$, $\text{E} = \text{O}$, $\text{G} = \text{Ca}$, $\text{J} = \text{Cl}$ 6 x 0,5p = **3 puncte**

b) Scrierea corectă a formulelor pentru: $\text{AB}_5\text{DE}_3 = \text{NH}_4\text{HCO}_3$ **2 puncte**

$\text{AB}_3 = \text{NH}_3$, $\text{DE}_2 = \text{CO}_2$, $\text{B}_2\text{E} = \text{H}_2\text{O}$, $\text{GJ}_2 = \text{CaCl}_2$, $\text{AB}_4\text{J} = \text{NH}_4\text{Cl}$, $\text{Y} = \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$... 6 x 0,5p = **3 puncte**

c) Modelarea corectă a formării anionilor elementelor **A, D, E** 3 x 1 p = **3 puncte**

Formarea legăturilor chimice din cationul sării **1 punct**



Scrierea corectă a ecuațiilor reacțiilor 2 x 1p (0,5p formule; 0,5p coeficienți) = **2 puncte**

Subiectul al IV-lea **(20 de puncte)**

a) $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2$

$\text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 2 x 1p (0,5p formule; 0,5p coeficienți) = **2 puncte**

b) $m_{\text{impurități}} = 36,4 \text{ g}$; $182 - 36,4 = 145,6 \text{ g CaO pur}$

$p = 80\%$ **3 puncte**

c) $m_{\text{hidroxid de calciu depus}} = 228,7155 - 36,4 = 192,3155 \text{ g}$

192,4 g $\text{Ca}(\text{OH})_2$ format din 145,6 g CaO și 46,8 g H_2O .

$192,4 - 192,3155 = 0,0845 \text{ g Ca}(\text{OH})_2$ dizolvat în $95,4 - 46,8 = 48,6 \text{ g apă}$;

$S = 0,0845 \cdot 100 / 48,6 = 0,1738 \text{ g Ca}(\text{OH})_2 / 100 \text{ g H}_2\text{O}$ la 20°C **5 puncte**

d) $36,5x + 18y = 650$

$$18x + 10y = 349,265$$

$x = 5,2 \text{ mol HCl}$, $y = 25,5665 \text{ mol H}_2\text{O}$ în soluția de HCl;

$m_{\text{soluție finală}} = 891 \text{ g}$ **5 puncte**

Inițial 891 g soluție 288,6 g CaCl_2 602,4 g H_2O

Adăug x g $\text{CaCl}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$

147 g $\text{CaCl}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ 111 g CaCl_2 36 g H_2O

x g $\text{CaCl}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ a = $111x/147$ g CaCl_2 b = $36x/147$ g H_2O

$m_{\text{cristalohidrat adăugat}} = 285,6 \text{ g CaCl}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ **5 puncte**

Barem elaborat de:

prof. Mariana Dejanu – Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Pitești

prof. Carmen-Luiza Gheorghe – Seminarul Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul", Buzău

prof. Carmen Istodor – Colegiul Național "Gheorghe Șincai" București

prof. Lavinia Mureșan – Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Cluj Napoca

prof. Irina Popescu – Colegiul Național "I. L. Caragiale", Ploiești